**ANEXO U**

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE

1ª COMPANHIA DE INFANTARIA

(1ª Companhia Independente de Fuzileiros/1954)

**LISTA REFERENCIAL DO FUSEX DA GUARNIÇÃO DE PAULO AFONSO/BA**

**CAPÍTULO I - Lista referencial para exames laboratoriais e anatomopatológicos.**

| EXAMES LABORATORIAIS | Valor (R$) |
|---|---|
| Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | **11,92** |
| Colesterol total | **5,37** |
| Colesterol (HDL) | **7,45** |
| Colesterol (LDL) | **9,89** |
| Colesterol (VLDL) | **9,89** |
| Triglicerídeos | **7,45** |
| Glicose | **5,37** |
| Transaminase oxalacética (amino transferase aspartato) TGO | **9,89** |
| Transaminase pirúvica (amino transferase de alanina) TGP | **9,89** |
| Rotina de urina (caracteres físicos, elementos anormais e sedimentoscopia) | **11,46** |
| Parasitológico fezes | **13,05** |
| HIV1+ HIV2, (determinação conjunta), pesquisa de anticorpos | **35,00** |

| | |
|---|---|
| HTLV1 ou HTLV2 pesquisa de anticorpo (cada) | **250,00** |
| HTLV I / II por PCR (cada) | **380,00** |
| HIV1 ou HIV2, pesquisa de anticorpos | **30,00** |
| Tireoestimulante, hormônio (TSH) | **27,81** |
| Uréia | **5,37** |
| Creatinina | **5,37** |
| Fosfatase alcalina | **9,89** |
| Gama-glutamil transferase GGT | **9,89** |
| Potássio | **5,37** |
| Sódio | **5,37** |
| Tiroxina (T4) | **27,81** |
| Ácido úrico | **5,37** |
| Tempo de protrombina | **7,81** |
| Toxoplasmose IgG | **24,54** |
| Toxoplasmose IgM | **29,80** |
| Citomegalovírus IgG | **24,54** |
| Citomegalovírus IgM | **29,80** |
| 1,25-dihidroxi vitamina D | **60,00** |
| Resistência globular, curva de | **7,81** |
| Coagulograma (TS, TC, prova do laço, retração do coágulo, contagem de | **33,83** |
| Fator reumatóide, teste do látex (qualitativo) | **15,99** |
| Fator antinúcleo, (FAN), pesquisa | **16,35** |
| Sangue oculto, pesquisa | **13,05** |
| Larvas (fezes), pesquisa | **10,65** |
| Marcadores tumorais (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, etc.) cada | **35,00** |
| Hepatite B - HBSAG (AU, | **38,00** |

| | |
|---|---|
| antígeno austrália) | |
| Hepatite C - anti-HCV | **63,00** |
| Bilirrubinas (direta, indireta e total) | **5,37** |
| Antígeno carcinoembriogênico (CEA) | **80,00** |
| IgE, grupo específico, cada | **30,15** |
| IgE, total | **31,50** |
| Lactose, teste de tolerância | **145,00** |
| Amilase | **9,89** |
| Proteínas totais | **6,86** |
| Albumina | **5,37** |
| Ferro sérico | **7,45** |
| Ferritina | **22,50** |
| Vitamina B12 | **24,06** |
| Zinco | **38,50** |
| Insulina | **29,56** |
| T3 retenção, dosagem | **27,81** |
| T3 reverso, dosagem | **72,00** |
| T3 livre | **31,74** |
| T4 livre | **34,76** |
| Testosterona livre | **48,50** |
| Testosterona totaL | **41,23** |
| Progesterona | **31,74** |
| Vitamina “D” 25 HIDROXI, dosagem (Vitamina D3) | **67,72** |
| Globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG) | **73,51** |
| Alfa-1-antitripsina, dosagem no soro | **15,99** |
| Anticorpos antitireóide (tireoglobulina) | **56,00** |
| Antimicrossomal | **41,94** |
| Grupo sanguíneo ABO, e | **12,60** |

| | |
|---|---|
| fator Rho (inclui Du) | |
| Hormônio gonodotrofico corionico quantitativo (HCG-Beta-HCG) | **29,25** |
| Hepatite B - HBSAC (anti-antígeno de superfície) | **38,00** |
| Cultura automatizada | **55,00** |
| Cultura, urina com contagem de colônias (UROCULTURA) | **28,77** |
| Antibiograma (teste de sensibilidade e antibióticos e quimioterápicos),por bactéria - não automatizada | **34,89** |
| Hematoxilina férrica, pesquisa de protozoários | **25,12** |
| Estradiol E2 | **41,23** |
| Folículo estimulante, hormônio (FSH) | **29,56** |
| Hormônio luteinizante (LH) | **29,56** |
| Glicemia após sobrecarga com dextrosol ou glicose | **38,00** |
| Microalbuminúria | **25,12** |
| Prova do LH-Rh, dosagem do FSH sem fornecimento de medicamento (cada) | **22,66** |
| Prova do LH-Rh, dosagem do LH sem fornecimento de medicamento (cada) | **22,66** |
| Falcização, teste de | **35,20** |
| Herpes simples - IgG | **45,88** |
| Herpes simples - IgM | **55,55** |
| Rubéola - IgG | **24,54** |
| Rubéola - IgM | **29,80** |
| Hemoglobina glicada (A1 total) | **25,12** |
| Hemoglobina glicada (Fração A1c) | **45,51** |

| | |
|---|---|
| Antígeno específico prostático livre (PSA livre) | **43,35** |
| Antígeno específico prostático total (PSA) | **33,45** |
| Cálcio | **5,37** |
| Frutosaminas (proteínas glicosiladas | **9,89** |
| Creatino fosfoquinase total (CK) | **14,76** |
| Ácido fólico, dosagem nos eritrócitos | **59,90** |
| Sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA) | **41,18** |
| Dehidroepiandrosterona (DHEA) | **53,39** |
| Hemossedimentação, (VHS) | **5,37** |
| Apolipoproteína B (Apo B) | **24,06** |
| Calcitonina | **82,00** |
| PTH | **82,00** |
| Vitamina A, dosagem | **95,00** |
| Vitamina E | **95,00** |
| Magnésio | **5,37** |
| Lipase | **9,89** |
| Triiodotironina (T3) | **27,81** |
| Crescimento, hormônio do (HGH) | **31,74** |
| Teste oral de tolerância à glicose - 2 dosagens | **41,94** |
| Prolactina | **37,88** |
| Cromo | **45,51** |
| Androstenediona | **65,50** |
| Cortisol | **41,23** |
| Apolipoproteína A (Apo A) | **24,06** |
| Apolipoproteína B (Apo B) | **24,06** |
| Proteína C reativa, | **29,80** |

| | |
|---|---|
| quantitativa | |
| Proteína C reativa, qualitativa | **15,99** |
| Somatomedina C (IGF1) | **86,00** |
| Dihidrotestosterona (DHT | **65,50** |
| Anticorpo anti-receptor de TSH (TRAB) | **88,00** |
| Ácido ascórbico (vitamina C) | **90,00** |
| Fósforo | **5,37** |
| Leucócitos e hemácias, pesquisa nas fezes | **6,21** |
| Substâncias redutoras nas fezes | **6,21** |
| Hematoxilina férrica, pesquisa de protozoários | **9,39** |
| Identificação de helmintos, exame de fragmentos | **6,21** |
| Hepatite C (quantitativo) por PCR | **260,00** |
| Alfa-1-glicoproteína ácida | **15,99** |
| Tireoglobulina | **56,00** |
| Sífilis - FTA-ABS-IgG | **18,10** |
| Sífilis - FTA-ABS-IgM | **18,10** |
| Sífilis - TPHA | **15,99** |
| Sífilis - VDRL | **10,24** |
| Tempo de tromboplastina parcial ativada | **7,81** |
| Hepatite A - HAV - IgG | **24,90** |
| Hepatite A - HAV - IgM | **30,15** |
| Hepatite B - HBCAC - IgG (anti-core IgG ou Acoreg) | **43,50** |
| Hepatite B - HBCAC - IgM (anti-core IgM ou Acorem) | **34,80** |
| Peptídeo C | **58,73** |
| Aslo | **16,35** |

| | |
|---|---|
| Aslo, quantitativo | **29,86** |
| Homocisteína | **45,51** |
| Proteínas totais albumina e globulina | **7,45** |
| Eletroforese de proteínas | **25,12** |
| Capacidade de combinação do ferro | **28,78** |
| Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6FD | **18,44** |
| Hemocultura (por amostra) | **31,22** |
| HIV - antígeno P24 | **199,75** |
| Cultura bacteriana (em diversos materiais biológicos) | **31,22** |
| 3-metil histamina, dosagem no soro | **45,51** |
| 5-nucleotidase | **36,95** |
| Acetaminofen | **94,47** |
| Acetilcolinesterase, em eritrócitos | **25,12** |
| Acetona, dosagem no soro | **90,00** |
| Ácido beta HIDROXIBUTIRATO | **300,00** |
| Ácido glioxílico | **29,63** |
| Ácido láctico (lactato) | **15,00** |
| Ácido orótico | **950,00** |
| Ácido oxálico | **97,00** |
| Ácido pirúvico | **64,01** |
| Ácido siálico | **14,76** |
| Ácido valpróico | **45,51** |
| Ácidos biliares | **64,01** |
| Ácidos graxos livres | **45,51** |
| Ácidos orgânicos (perfil quantitativo) | **650,00** |
| Acilcarnitinas (perfil qualitativo) | **700,00** |
| Acilcarnitinas (perfil | **700,00** |

| | |
|---|---|
| quantitativo) | |
| Aldolase | **9,89** |
| Alfa-2-macroglobulina | **51,00** |
| Alumínio, dosagem no soro | **45,51** |
| Amilase ou alfa-amilase, isoenzimas | **64,00** |
| Aminoácidos, fracionamento e quantificação | **660,00** |
| Amiodarona | **185,53** |
| Amitriptilina, nortriptilina (cada) | **72,00** |
| Amônia sangue | **29,63** |
| Anfetaminas, dosagem | **163,33** |
| Antibióticos, dosagem no soro, cada | **45,51** |
| Barbitúricos, antidepressivos tricíclicos (cada) | **45,51** |
| Benzodiazepínicos e similares (cada) | **45,51** |
| Beta-glicuronidase | **300,00** |
| Cálcio iônico | **14,76** |
| Carbamazepina | **45,51** |
| Carnitina livre | **63,40** |
| Carnitina total e frações | **645,00** |
| Caroteno | **7,45** |
| Ceruloplasmina | **15,99** |
| Ciclosporina, methotrexate - cada | **68,04** |
| Clearance de ácido úrico | **14,76** |
| Clearance de creatinina | **14,76** |
| Clomipramina | **115,00** |
| Cloro | **5,37** |
| Cobre | **45,51** |
| Cocaína, dosagem | **160,52** |

| | |
|---|---|
| Cotinina | **60,00** |
| Creatina | **50,00** |
| Creatino fosfoquinase - fração MB - atividade | **29,63** |
| Creatino fosfoquinase - fração MB - massa | **45,51** |
| Cromatografia de aminoácidos (perfil qualitativo) | **45,51** |
| Desidrogenase alfa-hidroxibutirica | **70,00** |
| Desidrogenase láctica - isoenzimas fracionadas | **135,00** |
| Digitoxina ou digoxina | **45,51** |
| Eletroforese de glicoproteínas | **25,12** |
| Eletroforese de proteínas de alta resolução | **45,51** |
| Enolase | **230,00** |
| Fenilalanina, dosagem | **48,00** |
| Etossuximida | **208,25** |
| Fenitoína | **45,51** |
| Formaldeído | **29,63** |
| Fosfatase ácida fração prostática | **18,00** |
| Fosfatase alcalina com fracionamento de isoenzimas | **147,00** |
| Fosfatase alcalina termo-estável | **9,89** |
| Fosfolipídios | **87,00** |
| Fósforo, prova de reabsorção tubular | **9,89** |
| Galactose | **20,01** |
| Galactose 1-fosfatouridil transferase, dosagem | **252,85** |
| Gasometria (pH, pCO2, SA, O2, excesso base) | **69,00** |
| Gasometria + Hb + Ht + Na | **89,00** |

| | |
|---|---|
| + K + Cl + Ca + glicose + lactato (quando efetuado no gasômetro) | |
| Haptoglobina | **59,96** |
| Hemoglobina plasmática livre | **14,76** |
| Hexosaminidase A | **384,51** |
| Hidroxiprolina | **29,63** |
| Imipramina - desipramina | **236,80** |
| Imunofixação - cada fração | **68,00** |
| Isoniazida | **45,51** |
| Lamotrigina | **120,00** |
| Lidocaína | **107,00** |
| Lipídios totais | **9,64** |
| Lítio | **7,45** |
| Maltose, teste de tolerância | **29,63** |
| Mioglobina, dosagem | **45,51** |
| Mucopolissacaridose, pesquisa | **25,12** |
| Mucoproteínas | **18,00** |
| Ocitocinase, dosagem | **25,12** |
| Osmolalidade | **53,90** |
| Oxcarbazepina, dosagem | **45,51** |
| PAPP-A | **100,88** |
| Peptídeo natriurético BNP/PROBNP | **110,97** |
| Perfil lipídico / lipidograma (lípidios totais, colesterol, triglicerídios e eletroforese lipoproteínas) | **45,51** |
| Piruvatoquinase | **122,13** |
| Porfirinas quantitativas (cada) | **28,85** |
| Pré-albumina | **86,30** |
| Primidona | **189,60** |
| Procalcitonina | **192,19** |
| Propanolol | **45,51** |

| | |
|---|---|
| Quinidina | **45,51** |
| Reserva alcalina (bicarbonato) | **39,89** |
| Sacarose, teste de tolerância | **29,63** |
| Succinilacetona | **395,25** |
| Tacrolimus | **217,42** |
| Teste de tolerância a insulina ou hipoglicemiantes orais ( até 6 dosagens) | **28,46** |
| Tirosina | **230,65** |
| Transferrina | **19,29** |
| Triazolam | **68,04** |
| Trimipramina | **350,00** |
| Tripsina imuno reativa (IRT) | **78,20** |
| Troponina | **45,51** |
| Vitamina E | **122,13** |
| Xilose, teste de absorção à | **29,63** |
| Anticoagulante lúpico, pesquisa | **24,62** |
| Anticorpo anti A e B | **18,44** |
| Anticorpo antimieloperoxidase, MPO | **209,24** |
| Anticorpos antiplaquetários, citometria de fluxo | **58,42** |
| Anticorpos irregulares | **44,66** |
| Anticorpos irregulares, pesquisa (meio salino a temperatura ambiente e 37º e teste indireto de coombs) | **41,15** |
| Antitrombina III, dosagem | **50,06** |
| Ativador tissular de plasminogênio (TPA) | **486,20** |
| Baço, exame de esfregaço de aspirado | **112,22** |

| | |
|---|---|
| CD... (antígeno de dif. Celular, cada determinação) | **102,06** |
| Células LE | **46,12** |
| Citoquímica para classificar leucemia: esterase, fosfatase leucocitária, PAS, peroxidase ou SB, etc – cada | **19,50** |
| Consumo de protrombina | **18,44** |
| Coombs direto | **8,67** |
| Coombs indireto | **23,62** |
| Dímero D | **110,97** |
| Enzimas eritrocitárias, (adenilato quinase, desidrogenase láctica, fosfofructoquinase, fosfoglicerato quinase, gliceraldeído, 3 - fosfato desidrogenase, glicose fosfato isomerase, glicose 6 - fosfato desidrogenase, glutation peroxidase, glutation), pesquisa e/ou dosagem | **19,50** |
| Enzimas eritrocitárias, rastreio para deficiência | **14,18** |
| Esplenograma (citologia) | **48,32** |
| Estreptozima | **24,90** |
| Fator VIII, dosagem do antígeno (Von Willebrand) | **155,67** |
| Fator X, dosagem | **69,08** |
| Fator XIII, pesquisa | **63,95** |
| Fenotipagem do sistema Rh-Hr (anti Rho(D) + anti Rh(C) + | **44,66** |
| Fibrinogênio, teste funcional, dosagem | **14,20** |
| Grupo ABO, classificação reversa | **11,11** |
| Heinz, corpúsculos, pesquisa | **35,84** |
| Hematócrito, determinação do | **8,67** |
| Hemoglobina (eletroforese ou HPLC) | **29,63** |

| | |
|---|---|
| Hemoglobina instabilidade a 37 graus C | **7,09** |
| Hemoglobina, solubilidade (HbS e HbD) | **35,84** |
| Hemossiderina (siderócitos), sangue ou urina | **63,65** |
| Heparina, dosagem | **44,66** |
| Imunofenotipagem para hemoglobinúria paroxistica noturna (*) | **635,00** |
| Imunofenotipagem para leucemias agudas ou sindrome mielodisplásica (*) | **714,40** |
| Imunofenotipagem para linfoma não hodgkin / sindrome linfoproliferativa crônica (*) | **214,49** |
| Inibidor do TPA (PAI) . | **230,00** |
| Leucócitos, contagem | **8,60** |
| Linfonodo, exame de esfregaço de aspirado | **112,22** |
| Meta-hemoglobina, determinação da | **21,58** |
| Mielograma | **250,00** |
| Plaquetas, teste de agregação (por agente agregante), cada | **76,41** |
| Plasminogênio, dosagem | **110,97** |
| Plasmódio, pesquisa | **5,72** |
| Produtos de degradação da fibrina, qualitativo | **69,08** |
| Produtos de degradação da fibrina, quantitativo | **76,41** |
| Proteína S, teste funcional | **110,97** |
| Protoporfirina eritrocitária livre - zinco | **68,00** |
| Prova do laço | **3,78** |
| Reticulócitos, contagem | **7,81** |
| Retração do coágulo | **3,78** |

| | |
|---|---|
| Ristocetina, co-fator, teste funcional, dosagem | **176,29** |
| Sulfo-hemoglobina, determinação d | **38,00** |
| Tempo de coagulação | **3,78** |
| Tempo de reptilase | **11,11** |
| Tempo de sangramento de IVY | **29,23** |
| Tempo de trombina | **11,11** |
| Tripanossoma, pesquisa | **5,72** |
| Tromboelastograma | **110,97** |
| Adenovírus, IgG | **24,90** |
| Adenovírus, IgM | **34,18** |
| Alérgenos - perfil antigênico (painel C/36 antígenos) | **880,51** |
| Amebíase, IgG | **24,90** |
| Amebíase, IgM | **34,18** |
| Anti-actina | **70,30** |
| Anti Candida - IgG e IgM (cada) | **34,18** |
| Anticardiolipina - IgA | **34,18** |
| Anticardiolipina - IgG | **24,90** |
| Anticardiolipina - IgM | **34,18** |
| Anticentrômero | **34,18** |
| Anticorpo anti Saccharamyces - ASCA | **71,23** |
| Anticorpo anti-DNAse B | **34,18** |
| Anticorpos anti-ilhota de langherans | **39,77** |
| Anticorpos anti-influenza A, IgG | **24,90** |
| Anticorpos anti-influenza A, IgM | **34,18** |
| Anticorpos naturais - isoaglutininas, pesquisas | **18,79** |
| Anticortex supra-renal | **32,93** |

| | |
|---|---|
| Antidesoxiribonuclease B, neutralização quantitativa | **58,58** |
| Antiescleroderma (SCL 70) | **33,29** |
| Antifigado (glomerulo, tub. Renal corte rim de rato), IFI | **116,25** |
| Antígenos metílicos solúveis do BCG (1 aplicação) | **20,66** |
| Antigliadina (glúten) - IgA | **44,15** |
| Antigliadina (glúten) - IgG | **44,15** |
| Antigliadina (glúten) - IgM | **44,15** |
| Antimitocondria, M2 | **30,15** |
| Antimúsculo cardíaco | **24,90** |
| Antineutrófilos (anca) C | **34,18** |
| Antineutrófilos (anca) P | **34,18** |
| Antiparietal | **24,90** |
| Antiperoxidase tireoideana | **42,95** |
| Aspergilus, reação sorológica | **30,15** |
| Avidez de IgG para toxoplasmose, citomegalia, rubéola, EB e outros, cada, dosagem | **45,88** |
| Beta-2-microglobulina | **142,27** |
| Biotinidase atividade da, qualitativo | **20,01** |
| Blastomicose, reação sorológica | **24,90** |
| Brucela - IgM | **30,15** |
| Brucela, prova rápida | **9,89** |
| CA 50 | **50,00** |
| Caxumba, IgM | **64,78** |
| Chagas IgG | **24,90** |
| Chagas IgM | **30,15** |
| Chlamydia PNEUMONIAE - IgM | **39,77** |

| | |
|---|---|
| Cisticercose, AC | **30,15** |
| 17-alfa-hidroxiprogesterona | **40,83** |
| Cromatografia de aminoácidos (perfil quantitativo) | **45,51** |
| Citomegalovirus avidez IgG | **24,54** |
| Citomegalovírus IgM ELISA | **29,80** |
| Clostridium difficile, toxina A | **34,18** |
| Complemento C2 | **185,30** |
| Complemento C3 | **19,29** |
| Complemento C3, C4 - turbid. ou nefolométrico C3A | **38,47** |
| Complemento C4 | **19,29** |
| Complemento C5 | **58,60** |
| Complemento CH-50 | **15,99** |
| Crio-aglutinina, globulina, dosagem, cada | **16,35** |
| Crio-aglutinina, globulina, pesquisa, cada | **15,07** |
| Crioglobulinas, caracterização - imunoeletroforese | **24,90** |
| Cross match (prova cruzada de histocompatibilidade para transplante renal) | **71,23** |
| Cultura ou estimulação dos linfócitos “in vitro” por concanavalina, PHA ou pokweed | **68,04** |
| Dengue - IgG e IgM (cada) | **39,77** |
| DNCB - teste de contato | **45,51** |
| Echovírus (painel) sorologia para | **104,68** |
| Equinococose (Hidatidose), reação sorológica | **15,99** |

| | |
|---|---|
| Equinococose, IDR | **10,24** |
| Esporotriquina, IDR | **10,24** |
| Fator reumatóide, quantitativo | **15,99** |
| Filaria sorologia | **24,90** |
| Frei (linfogranuloma venéreo), IDeR | **10,24** |
| Giardia, reação sorológica | **24,90** |
| Gonococo - IgM | **34,18** |
| Helicobacter pylori - IgG | **56,14** |
| Helicobacter pylori - IgM | **68,60** |
| Hepatite B - HBeAG (anti HBE) | **215,34** |
| Hepatite B - HBeAG (antígeno “E”) | **10,24** |
| Hepatite C - anti-HCV - IgM | **45,88** |
| Hepatite C - imunoblot | **96,50** |
| Hepatite delta, anticorpo IgG | **56,14** |
| Hepatite delta, anticorpo IgM | **54,92** |
| HER-2-dosagem do receptor | **215,34** |
| Hipersensibilidad e retardada (intradermo reação IDeR ) candidina, caxumba, estreptoquinase-dornase, PPD, tricofitina, vírus vacinal, outro(s), cada | **10,24** |
| Histamina, dosagem | **45,88** |
| Histoplasmose, reação sorológica | **24,90** |
| HLA-DR | **299,48** |
| HLA-DR+DQ | **322,19** |
| IgA | **15,99** |
| IgA na saliva | **19,65** |
| IgE, por alérgeno, cada (cada) | **24,90** |

| | |
|---|---|
| IgG | **15,99** |
| IgG, subclasses 1,2,3,4 (cada) | **68,04** |
| IgM | **15,99** |
| Imunocomplexos circulantes | **30,15** |
| Inibidor de C1 esterase | **33,83** |
| Isospora, pesquisa de antígeno | **9,88** |
| Ito (cancro mole), IDeR | **10,24** |
| Legionella - IgG e IgM (cada) | **70,30** |
| Leishmaniose - IgG e IgM (cada) | **24,90** |
| Leptospirose - IgG | **30,15** |
| Leptospirose - IgM | **48,00** |
| Leptospirose, aglutinação | **48,00** |
| Linfócitos T “helper” contagem de (IF com OKT-4) (CD-4+) citometria de fluxo | **102,06** |
| Listeriose, reação sorológica | **86,70** |
| Lyme - IgG | **45,88** |
| Malária - IgG | **24,90** |
| Malária - IgM | **30,15** |
| Paratormônio - PTH ou fração (cada) | **93,32** |
| Androstenediona | **65,50** |
| Adrenocorticotrófico, hormônio (ACTH) | **81,89** |
| Alfa-fetoproteína | **39,06** |
| Desidrogenase láctica | **9,89** |
| Espermograma (caracteres físicos, pH, fludificação, motilidade,vitalidade, contagem e morfologia) | **44,29** |
| Rubéola - IgG | **24,54** |
| Rubéola - IgM | **29,80** |

| | |
|---|---|
| Anti-DNA | **19,65** |
| Anti-RNP | **24,90** |
| Anti-Ro/SSA | **24,90** |
| Anticorpos anti insulina | **34,18** |
| Cultura fezes: salmonella, shigella e escherichia coli enteropatogênicas (sorologia incluída) | **44,29** |
| Dímero D | **110,97** |
| Anticorpos antiendomisio - IgG, IgM, IgA (cada) | **45,88** |
| Herpes zoster - IgG | **24,90** |
| Herpes zoster - IgM | **30,15** |
| Vírus Zika – IgM | **256,09** |
| PPD (tuberculina), IDeR | **10,24** |
| Gonadotrófico coriônico, hormônio (HCG) | **22,78** |
| Curva glicêmica (6 dosagens) | **49,30** |
| Anti-Sm | **24,90** |
| Antibiograma automatizado | **55,65** |
| Pesquisa ou dosagem de um componente urinário (proteinúria 24 horas) | **6,58** |
| B.A.A.R. (Ziehl ou fluorescência, pesquisa direta e após homogeneização) | **9,88** |
| Procedimento diagnóstico por captura híbrida | **417,19** |
| Waaler-Rose (fator reumatóide) | **10,24** |
| Chlamydia - IgG | **30,15** |
| Testes químicos de triagem em urina para erros inatos do metabolismo (cada) | **17,37** |
| HIV - carga viral PCR – pesquisa | **310,00** |
| Biotinidase atividade da, | **20,01** |

| | |
|---|---|
| qualitativo, dosagem | |
| Coprológico funcional (caracteres, pH, digestibilidade, amônia, ácidos orgânicos e interpretação) | **21,97** |
| Citomegalovírus - quantitativo, por PCR. | **345,52** |
| Protrombina, pesquisa de mutação | **225,60** |
| Fator V de layden por PCR, pesquisa | **220,00** |
| Cariótipo de sangue (técnicas com bandas) | **4,15** |
| Anti-LA/SSB, pesquisa | **24,90** |
| Avaliação da composição corporal por bioimpedanciometria | **10,18** |
| Antígeno NS1 do vírus da Dengue | **125,60** |
| Anti-TPO, dosagem. | **42,95** |
| Gad-Ab-antidescarboxilase do ácido, dosagem. | **93,32** |
| Estrona, dosagem | **53,39** |
| Estriol, dosagem | **53,39** |
| Anti-Ro/SSA, pesquisa | **24,90** |
| Anti-Sm, pesquisa | **24,90** |
| Anti-RNP, pesquisa | **24,90** |
| IGF BP3 (proteína ligadora dos fatores de crescimento “insulin-like”), dosagem | **73,51** |
| Selênio, dosagem | **32,93** |
| Covid anticorpos IGG | **100,00** |
| Covid anticorpos IGM | **90,00** |
| Calprotectina, dosagem fetal (com diretriz de utilização 134) | **120,00** |
| Ensaio Interferon Gama | **220,00** |
| Epstein BARR, PCR | **360,00** |

| | |
|---|---|
| Fibrose cística 32+P | **148,16** |
| FISH microdeleção | **302,01** |
| Gene da mutação da Protrombina | **290,00** |
| HLA B51 pesquisa do alelo | **280,00** |
| Molecular Amiloidose | **9,89** |
| Mutação Metilenotetrahidr ofolato Redutase (MTFRH) | **225,00** |
| PCR alfa talassemia | **2.000,00** |
| PCR para citomegalovírus IgG | **24,54** |
| PCR para Herpes vírus | **125,00** |
| Quebras cromossômicas | **132,77** |
| Teste de anticorpos neutralizantes IgG após vacinação COVID-19 | **138,00** |
| Acetilcolina | **245,00** |
| Ácido Homovanílico | **170,00** |
| Alfa-Galactosidase | **800,00** |
| Alfa-Glicosidase (dosagem) | **450,00** |
| Anticorpos Anti – GAD | **150,00** |
| Arilsulfatase B | **350,00** |
| Arsênico – urina | **71,23** |
| Arsênico sangue | **72,50** |
| Beta Galactosidase | **650,00** |
| Cádmio – Heparina | **44,66** |
| Cistina – dosagem | **52,00** |
| Cobalto | **56,20** |
| Colinesterase (soro) | **28,00** |
| Cromatografia de aminoácidos no sangue - quantitativo | **65,00** |
| Cromatografia de aminoácidos na urina - quantitativo | **78,97** |
| Galactose-1-Fosfato | **750,00** |

| | |
|---|---|
| Uridiltransferase (com diretriz de utilização) | |
| Herpes IgG líquor | **259,66** |
| Herpes IgM líquor | **30,15** |
| Hexosaminidase A e B | **384,51** |
| Hidroxiprolina-urina | **204,84** |
| HIV 1 e 2 líquor | **39,77** |
| Inibidor C1 Esterase funcional | **89,30** |
| Inibidor de C1 quantitativo | **145,00** |
| Lítio endógeno | **8,00** |
| Mioglobina urinária | **83,30** |
| Mioglobina urina de 24hs | **83,30** |
| Ocitocina | **614,00** |
| Toxicológico concurso | **242,00** |
| Zika Vírus Anticorpo IgG | **256,09** |
| Zika Vírus Anticorpo IgM | **256,09** |
| Zinco Protoporfirina | **67,00** |
| Fator Von Willebrand | **155,67** |
| PTH Relaciona | **353,91** |
| Curva HGH pós glicose | **31,74** |
| HGH c/ Clonidina 180 | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 20m | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 30m | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 45m | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 60m | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 90m | **31,74** |
| HGH C/ Clonidina 120m | **31,74** |
| HGH pós exercício | **31,74** |
| Prolactina gancho | **42,90** |
| Teste HGH após Clonina | **31,74** |
| Tireoglobulina aspirado | **53,39** |
| TSH c/ Est TRH -120M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -15 M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -20 M | **27,81** |

| | |
|---|---|
| TSH c/ Est TRH -30 M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -40 M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -45 M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -60 M | **27,81** |
| TSH c/ Est TRH -90 M | **27,81** |
| Anticorpo Anti – fígado | **110,00** |
| Anti Pneumococos IgG | **180,00** |
| Cisticercose - (IF) | **30,15** |
| Cisticercose (Elisa) | **30,15** |
| Complemento C1q | **199,75** |
| Cortisol salivar | **41,23** |
| FTA - ABS – IgG (IFI) | **18,10** |
| FTA - ABS – IgM (IFI) | **19,65** |
| HIV - Teste confirmatório | **180,00** |
| Imunoeletroforese urinária | **171,01** |
| Morfologia Estrutural de Kruge – Espermograma | **44,29** |
| Proteína C Resistência | **87,00** |
| Rubéola IgM (ELFA) | **110,00** |
| Tétano IgG Anticorpo | **95,04** |
| Transglutaminase IgA | **85,00** |
| Vírus Influenza TP A | **110,00** |
| Vírus Influenza TP B | **110,00** |
| Cálculo urinário | **45,90** |
| **EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS** | |
| PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM MÚLTIPLOS FRAGMENTOS DO MESMO ORGÃO | **185,00** |
| PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PEÇA ANATÔMICA OU CIRÚRGICA SIMPLES | **135,00** |
| PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PEÇA CIRÚRGICA OU ANATÔMICA COMPLEXA | **235,00** |
| COLORAÇÃO ESPECIAL POR COLORAÇÃO | **135,00** |
| PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM LÂMINAS DE PAAF ATÉ 5 | **135,00** |

| | |
|---|---|
| PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PAINEL DE IMUNOISTOQUÍMICA DE 2 Á 5 MARCADORES | **835,00** |
| BIÓPSIA DE CECO | **164,93** |
| BIÓPSIA DE CÓLON ASCENDENTE | **164,93** |
| BIÓPSIA DE CÓLON DESCENDENTE | **164,93** |
| BIÓPSIA DE CÓLON SIGMÓIDE | **164,93** |
| BIÓPSIA DE CÓLON TRANSVERSO | **164,93** |
| BIÓPSIA DE ESÔFAGO | **164,93** |
| BIÓPSIA DE RETO | **164,93** |
| BIÓPSIA GÁSTRICA (ENDOSCOPIA) | **164,93** |
| BIÓPSIA GÁSTRICA + BIÓPSIA ESÔFAGO (2 FRASCOS SEPARADO) | **325,86** |