



Rua João Afonso Moreira, 365
Bairro Ouro Preto - Belo Horizonte - MG
licitacao@mg2nutricao.com.br
(31) 97228-3105

Atenciosamente,

À Prefeitura Municipal de Buenópolis,

Sr.(a) Pregoeiro(a)

A MG2 NUTRIÇÃO - LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n.º 39.935.073/0001-00, situada Rua João Afonso Moreira, 365 – ouro preto- Belo Horizonte – MG, vem respeitosamente informar seu interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 03/2026 – diante disto solicita os seguintes esclarecimentos:

Item 2:

Temos o produto **Alfaré 400g** da marca Nestlé, que atende ao descritivo sendo uma fórmula infantil extensamente hidrolisada, para faixa etária de 0 a 36 meses, com DHA e ARA, nucleotídeos, taurina, HMOs e sem lactose.

O nosso produto apresenta sua composição de carboidratos com **88% de Xarope de glicose, 12% de amido de batata**. E fonte de gordura sendo **42% TCM, 22% óleo de canola, 15% óleo de girassol, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 7% óleo de coco, 1% óleo de M. alpina rico em ARA e 1% óleo de microalgas Schizochytrium sp. com DHA**.

Encaminho ficha técnica para avaliação. Podemos estar participando com o nosso produto?

Aguardamos retorno.
Setor de Licitação.
MG2 NUTRIÇÃO LTDA-ME

MG2


Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA														
Nome do Produto	Alfaré®														
Designação Legal	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de proteína extensamente hidrolisada														
Definição do Produto	Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente hidrolisadas, isento de lactose e com triglicerídeos de cadeia média (TCM), DHA, ARA, nucleotídeos, taurina e HMO (2'FL e LNnT).														
Indicações	Lactentes e crianças de primeira infância, de 0 a 36 meses de idade, com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja, com comprometimento do trato gastrointestinal e/ou com restrição à lactose. ¹⁻⁴														
Características Técnicas	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <table> <tr> <td>Fonte de proteínas</td><td>100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada</td></tr> <tr> <td>Fonte de carboidratos</td><td>88% maltodextrina e 12% amido de batata</td></tr> <tr> <td>Fonte de gorduras</td><td>42% TCM, 22% óleo de canola, 15% óleo de girassol, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 7% óleo de coco, 1% óleo de <i>M. alpina</i> rico em ARA e 1% óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com DHA</td></tr> <tr> <td>Osmolaridade</td><td>171,8 mOsm/L de água</td></tr> <tr> <td>Osmolalidade</td><td>191,3 mOsm/kg de água</td></tr> <tr> <td>Apresentação</td><td>Lata de 400g</td></tr> <tr> <td>Sabor</td><td>Sem sabor</td></tr> </table> NÃO CONTÉM GLÚTEN	Fonte de proteínas	100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada	Fonte de carboidratos	88% maltodextrina e 12% amido de batata	Fonte de gorduras	42% TCM, 22% óleo de canola, 15% óleo de girassol, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 7% óleo de coco, 1% óleo de <i>M. alpina</i> rico em ARA e 1% óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com DHA	Osmolaridade	171,8 mOsm/L de água	Osmolalidade	191,3 mOsm/kg de água	Apresentação	Lata de 400g	Sabor	Sem sabor
Fonte de proteínas	100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada														
Fonte de carboidratos	88% maltodextrina e 12% amido de batata														
Fonte de gorduras	42% TCM, 22% óleo de canola, 15% óleo de girassol, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 7% óleo de coco, 1% óleo de <i>M. alpina</i> rico em ARA e 1% óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com DHA														
Osmolaridade	171,8 mOsm/L de água														
Osmolalidade	191,3 mOsm/kg de água														
Apresentação	Lata de 400g														
Sabor	Sem sabor														
Distribuição Energética	 45% Gorduras 44% Carboidratos 11% Proteínas														
Apresentação															

Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

	100g	100ml*
Valor energético (kcal)	500	67
Carboidratos (g)	54	7,3
Açúcares totais (g)	2,4	0,4
Açúcares adicionados (g)	2,4	0,4
Lactose (g)	0	0
Proteínas (g)	14	1,9
Carnitina (mg)	8,5	1,2
Gorduras totais (g)	25	3,4
Gorduras saturadas (g)	12	1,6
Gorduras trans (g)	0	0
Gorduras monoinsaturadas (g)	7,2	1
Gorduras poli-insaturadas (g)	4,4	0,6
Ácido linoleico (g)	3,5	0,5
Ácido araquidônico (g)	0,1	0,01
Ácido alfa-linolênico (mg)	445	60
Ácido docosahexaenóico (mg)	86	12
Fibras alimentares (g)	1,1	0,1
2'-o-fucosilactose (2'-FL) (g)	0,7	0,1
Lacto-N-Neotetraose (LNnT) (g)	0,4	0,05
Sódio (mg)	245	33
Vitamina A (µg)	480	65
Vitamina D (µg)	7,5	1
Vitamina E (mg)	10	1,3
Vitamina K (µg)	50	6,7
Vitamina C (mg)	85	11
Vitamina B1 (mg)	0,5	0,07
Vitamina B2 (mg)	1,1	0,15
Niacina (mg)	5	0,68
Ácido pantotênico (mg)	3,3	0,45
Vitamina B6 (mg)	0,52	0,07
Biotina (µg)	13	1,7
Ácido fólico (µg)	100	14
Vitamina B12 (µg)	3,5	0,47
Cálcio (mg)	530	71
Cloreto (mg)	440	59
Cobre (µg)	400	54
Ferro (mg)	5	0,68
Fósforo (mg)	340	46
Iodo (µg)	83	11
Magnésio (mg)	58	7,8
Manganês (mg)	0,07	0,01
Potássio (mg)	620	84
Selênio (µg)	12	1,6
Zinco (mg)	5	0,68
Colina (mg)	58	7,8
Taurina (mg)	49	6,6
Nucleotídeos (mg)	15	2
Inositol (mg)	50	6,7
*No alimento pronto para consumo.		

Reconstituição com 13,5 g de pó + 90 ml de água = 100 ml / Capacidade da colher medida: 4,5 g.

Sugestão de Consumo

Conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

AVISOS IMPORTANTES	Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho. O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista.																																		
Lista de Ingredientes	Maltodextrina, proteína extensamente hidrolisada do soro do leite de vaca*, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo de canola com baixo teor erúico, óleo de girassol, óleo de girassol com alto teor oleico, óleo de coco, glicerofosfato de cálcio, hidróxido de cálcio, 2'-O-fucosilactose*, hidróxido de potássio, fosfato de potássio monobásico, cloreto de magnésio, Lacto-N-Neotetraose*, cloreto de sódio, óleo de <i>Mortierella alpina</i> rico em ARA, óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com ácido docosahexaenóico (DHA), cloreto de cálcio, L-ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-inositol, taurina, sulfato ferroso, nucleotídeos, sulfato de zinco, acetato de DI-alfa tocoferila, cloreto de potássio, L-carnitina, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de cobre, riboflavina, acetato de retinila, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de potássio, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, selenato de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. *Fonte proteica. **2-O-fucosilactose e Lacto-N-Neotetraose: Oligossacarídeos.																																		
Modo de Preparo	1 medida rasa de pó (4,5 g) para 30 mL de água morna.  Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo.  Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.  Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.  Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, previamente fervida, indicada nas instruções de uso.  Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.  Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto.  Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no pulso antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C).  Após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.																																		
Instruções de Uso	Atenção: uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas, ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente ou criança. Para uma melhor diluição do produto sempre adicione o pó sobre a água e misture logo em seguida. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira.																																		
Diluição	<table><tr><th colspan="4">TABELA DE ALIMENTAÇÃO</th></tr><tr><th rowspan="2">Idade do lactente</th><th colspan="2">Quantidade para 1 mamadeira</th><th rowspan="2">Número de mamadeiras por dia</th></tr><tr><th>Água previamente fervida em ml</th><th>Número de medidas¹</th></tr><tr><td>1ª e 2ª semanas</td><td>90</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>3ª e 4ª semanas</td><td>120</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>2º mês</td><td>150</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>3º e 4º meses</td><td>180</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>5º e 6º meses</td><td>210</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>Após o 6º mês¹</td><td>210</td><td>7</td><td>3-4</td></tr></table> A reconstituição da fórmula é 1 colher medida rasa para cada 30 ml de água. A tabela de alimentação acima é uma sugestão de consumo. Não modifique as proporções sem consultar um médico ou nutricionista. Use somente a colher medida existente nesta embalagem. ¹Como as necessidades individuais podem variar, a introdução de novos alimentos deve ser feita mediante orientação de médico ou nutricionista. Utilizar menos pó do que a quantidade indicada poderá privar o lactente de uma nutrição adequada. Inversamente, quantidades maiores de pó podem provocar desidratação. Dica: Sempre segure a criança no colo ao alimentá-la. Uma criança que se alimenta sozinha pode engasgar.	TABELA DE ALIMENTAÇÃO				Idade do lactente	Quantidade para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia	Água previamente fervida em ml	Número de medidas ¹	1ª e 2ª semanas	90	3	6	3ª e 4ª semanas	120	4	5	2º mês	150	5	5	3º e 4º meses	180	6	5	5º e 6º meses	210	7	5	Após o 6º mês ¹	210	7	3-4
TABELA DE ALIMENTAÇÃO																																			
Idade do lactente	Quantidade para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia																																
	Água previamente fervida em ml	Número de medidas ¹																																	
1ª e 2ª semanas	90	3	6																																
3ª e 4ª semanas	120	4	5																																
2º mês	150	5	5																																
3º e 4º meses	180	6	5																																
5º e 6º meses	210	7	5																																
Após o 6º mês ¹	210	7	3-4																																
Conservação do Produto	Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos. Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento de consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado à temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas. Conservar a lata sempre em local seco, fresco e arejado.																																		

Referências	1. Solé D, et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018. Arq Asma Alerg Imunol, 2008;2(1). 2. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229. 3. Vandenplas Y, et al. Safety and adequacy of a semi-elemental formula for children with gastro-intestinal disease. Amino Acids, 2010; 38: 909–914 4. Vandenplas Y, et al. Safety and adequacy of an optimized formula for pediatric patients with cow's milk-sensitive enteropathy. Minerva Pediatrica, 2010; 62(4):339-45.
Informações Técnicas e Validade	Procedência: Holanda Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda. Fabricante: Nestlé Nederland b.v. Registro no Ministério da Saúde: 6.5965.0160 Validade do Produto: 24 meses

Patricia Carvalho
 Nestlé Brasil Ltda.
 Gerente da Qualidade
 CRQ 04351293