



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: MARCELA CRISTINA BAPTISTA DE JESUS VASCONCELOS ROSA
Prontuário: 1673376

USO INTRAVENOSO:

1) Belimumabe 400 MG _____ 12 frascos
Infundir 2 frascos a cada 4 semanas para manutenção por período mínimo de 6 meses.

Rio de Janeiro, 20/12/2024

Dr. Heloisa Tiemi A. Ruff
Reumatologista
CRM 52.108454-2



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: MARCELA CRISTINA BAPTISTA DE JESUS VASCONCELOS ROSA
Prontuário: 1673376

USO INTRAVENOSO:

2) Belimumabe 400 MG _____ 12 frascos
Infundir 2 frascos a cada 4 semanas para manutenção por período mínimo de 6 meses

Rio de Janeiro, 20/12/2024

Dr. Heloisa Tiemi A. Ruff
Reumatologista
CRM 52.108454-2





UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA

Nome: MARCELA CRISTINA BAPTISTA DE JESUS VASCONCELOS ROSA
RG.: 1673376

LAUDO MÉDICO

Paciente com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico em 2009 com acometimento renal (realizada biópsia que determina nefrite classe III), hematológico, cutâneo e articular, em acompanhamento nesta instituição.

A paciente em questão já foi submetida a tratamento com azatioprina, micofenolato de mofetila, hidroxicloroquina e ciclofosfamida (dose cumulativa de 9,4g), sendo refratária a todas as opções terapêuticas descritas no que tange a controle da doença de base e o acometimento renal. Devida a refratariedade da atividade renal da doença de base, foi realizada a infusão de Rituximabe 2 gramas em 2019, 2020, 2022 totalizando 3 ciclos. Porém paciente apresentou resposta parcial apenas.

Paciente iniciou tratamento com belimumabe em fevereiro de 2023. Possui resultado de biópsia renal demonstrando espessamento irregular de alças capilares, deposição de material hialino de permeio. Pelos achados na biópsia, confere indicação formal de uso de Belimumabe.

Paciente apresenta indicação de manutenção de belimumabe de forma crônica para controle da doença, e sua interrupção aumento exponencialmente o risco de reativação, que pode vir a determinar falência renal com necessidade de terapia renal substitutiva (hemodiálise), e aumento da morbimortalidade a curto e longo prazo.

Solicito liberação antes deste prazo visando controle de atividade de doença e prevenção de nova atividade por atraso na infusão.

CID: M32.1

Rafaela Rodrigues
Médica
CRM 52.0117188-7

À disposição para maiores esclarecimentos

Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2025